

ЛЕЧЕНИЕ РАКА СИГМОВИДНОЙ КИШКИ.

Автор: Профессор Коваленко В.Л., оперирующий онколог

Хирургический центр г. Анапа

Представляем новую медицинскую информацию о хирургическом лечении пациента с опухолью сигмовидной кишки в нашей клинике.

Пациент П., 71 года, обратился в Хирургический центр с жалобами на затруднение при дефекации. При колоноскопии в 25 см от заднего прохода в сигмовидной кишке была найдена суживающая просвет кишки опухоль. При обследовании по внутренним органам по данным компьютерной томографии обнаружены множественные очаговые образования в обоих легких и печени (метастазы). С целью профилактики осложнений со стороны первичной опухоли (кровотечение, перфорация, кишечная непроходимость) врачебным консилиумом решено на первом этапе выполнить хирургическое лечение по удалению первичной опухоли. 23.10.2023 г. операция — резекция сигмовидной кишки с восстановлением кишечной трубки с помощью одноразового циркулярного аппарата (хирурги Коваленко В.Л., Зайченко Д.Н.) (рис. 1). Выписан в удовлетворительном состоянии на 8 сутки после операции. Гистологическое и онкогенетическое исследование опухолевой ткани определило индивидуальную чувствительность опухолевых клеток к противоопухолевым лекарственным препаратам. В настоящее время пациент получает таргетную противоопухолевую терапию. Чувствует себя удовлетворительно.



Рис. 1. Макропрепарат резецированной сигмовидной кишки с опухолью (в центре).